


1103 Paulsen



Origen genético

Esta variedad fue obtenida a partir de un cruce entre Vitis berlandieri cv. Rességuier n°2 y Vitis rupestris cv. Lot.

Nombre de la variedad en Francia (y nombre habitual)

1103 P

Criador v año de obtención

Federico Paulsen, 1896.

Superficie estimada del viñedo francés injertado con este portainjerto y principales regiones de uso

9 000 ha . Charentes, Languedoc-Rosellón, Provenza-Alpes-Costa Azul, Córcega, Aquitania.

Elementos de descripción ampelográfica

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven semi-abierta, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes ligeramente bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con porte erguido y arbustivo, un contorno asurcado, entrenudos rojos en la cara dorsal y verdes en la cara ventral, una densidad nula de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos en los nudos,
- a los zarcillos bastante desarrollados,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, anchas y reniformes, enteras, con bordes hacia el haz y alabeadas, con un seno peciolar abierto con fondo limitado por el nervio cerca del peciolo, una pigmentación antociánica ligera de los nervios cerca del peciolo, dientes cortos a medianos respecto a su anchura, un limbo mate, bastante claro y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las flores del sexo masculino.

Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1965	1975	1985	1995	2005	2015
ha	114	239	104	69	113	82

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	234	233	236	196	252	236	241	259
Allele 2	145	234	257	249	214	264	249	251	259

Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

Resistencia a las plagas del suelo

El 1103 P posee un grado de tolerancia elevado a la filoxera radicícola. Por el contrario, su resistencia a los nematodos *Meloidogyne incognita* es moderada y es sensible a los nematodos *Meloidogyne arenaria*.

Aptitudes para la multiplicación vegétativa

La producción de tronco del 1103 P es baja a moderada (25 000 a 60 000 m/ha), con cierta proporción inservible (troncos torcidos, rotos). El crecimiento de los brotes anticipados es importante, lo que contribuye, junto a la presencia de zarcillos, a dificultar el desestaquillado de este portainjerto. La aptitud para el estaquillado del 1103 P es moderada y su aptitud para el injertado es muy buena.

Selección clonal en Francia

En Francia, los 7 clones autorizados de la variedad 1103 P llevan los números 112, 113, 168, 202, 767, 768 y 1050. De ellos, los clones objeto de multiplicación son:

- clon n.º 113: 26 ha y 90 áreas de vides madre productoras de material certificado en 2017,
- clon n.º 168: 51 áreas de vides madre productoras de material certificado en 2017,
- clon n.º 767: 1 ha y 28 áreas de vides madre productoras de material certificado en 2017,
- clon n.º 768: 52 ha y 43 áreas de vides madre productoras de material certificado en 2017,
- clon n.º 1050: 2 ha y 54 áreas de vides madre productoras de material certificado en 2017.
 Los datos proceden de: Les chiffres de la pépinière viticole 2017, Datos y balances de FranceAgriMer, mayo de 2018.

Adaptación al medio ambiente

El 1103 P tolera hasta un 30 % de caliza total, un 17 % de caliza activa y un IPC de 30. Su resistencia a la clorosis férrica puede entonces considerarse moderada. Se adapta muy bien a las condiciones de sequía, así como a los suelos compactos, con posible presencia de una humedad primaveral temporal importante. El 1103 P absorbe bien el magnesio. Además, tiene un buen comportamiento en suelos áridos y su tolerancia a los cloruros es bastante buena.

Interacción con el injerto y objetivos de producción

El vigor conferido por el 1103 P es importante. Este portainjerto tiene tendencia a producir rebrotes. El ensamblaje con la Syrah produce buenos resultados, pero se han señalado algunos problemas de afinidad con el Tempranillo.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier