

Gamay de Bouze N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad procede de una mutación de la Gamay.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Gamay de Bouze

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Gamay de Bouze está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Bulgaria.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes ligeramente bronceadas,
- a las bayas que presentan un color de la epidermis prácticamente verde hasta el envero y una pulpa con color al madurar.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 77 | 54 | 385 | 310 | 126 |

Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 232 | 239 | 178 | 194 | 244 | 238 | 216 | 239 |
| Allele 2 | 135 | 236 | 249 | 186 | 204 | 246 | 238 | 245 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades de esta variedad se parecen a las de otros tipos de Gamay teinturier y Gamay.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Gamay de Bouze llevan los números 223 y 431. En 2006, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una treintena de clones en los viñedos de Ródano.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. Los vinos obtenidos presentan un buen color (menos que el Gamay Fréaux, pero mucho más que el Gamay). Son menos afrutados que los elaborados a partir del Gamay.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento del Gamay de Bouze frente a las enfermedades y las plagas es comparable al del Gamay.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*