

Gamay de Chaudenay N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad procedería de una mutación del Gamay de Bouze.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Gamay de Chaudenay

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Gamay de Chaudenay está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes bronceadas,
- a las bayas que presentan un color gris de la epidermis antes del envero y una pulpa con color al madurar.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 119 | 92 | 375 | 247 | 99 |

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 232 | 239 | 178 | 194 | 244 | 238 | 216 | 239 |
| Allele 2 | 135 | 236 | 249 | 186 | 204 | 246 | 238 | 245 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es poco vigorosa, pero garantiza una producción regular. Sus cualidades son comparables a las del Gamay.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Gamay de Chaudenay llevan los números 567 y 568. En 2006, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una treintena de clones en los viñedos de Ródano.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. Los vinos obtenidos presentan un buen color (menos que el Gamay Fréaux, pero mucho más que el Gamay de Bouze). Son menos afrutados que los elaborados a partir del Gamay.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento del Gamay de Chaudenay frente a las enfermedades y las plagas es comparable al del Gamay.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*