

Goldriesling B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad procedería de un cruce entre el Riesling y el Précoce de Malingre obtenida por C. Oberlin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Goldriesling

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Goldriesling está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria y Dinamarca.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales con la base en U, un seno peciolar cerrado de lóbulos ligeramente superpuestos, dejando un orificio redondeado, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo alabeado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	70	47	6	0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	178	194	246	248	227	251
Allele 2	149	225	249	186	204	246	254	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Goldriesling es poco vigoroso, productivo, pero bastante sensible al frío invernal. Su desborre precoz la expone asimismo a las heladas de primavera.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Goldriesling permite elaborar unos vinos de calidad media.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Goldriesling es sensible al mildiu y a la podredumbre gris. Sufre menos los efectos del oídio.

Fenología


Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*