


# Amandin B

Variedad ornamental para aficionados.



## Origen

Esta variedad se obtuvo en 1979 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

## Usar

Variedad ornamental para aficionados.

## Nombre de la variedad en Francia

Amandin

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Amandin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas cuneiformes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, dientes medianos a largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula o muy reducida de los nervios, un limbo liso, brillante, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica u ovoide, con un ligero sabor a moscatel.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	229	247	176	186	256	240	235	255
Allele 2	143	236	249	186	192	262	254	243	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Amandin presenta un vigor medio a elevado. Es una variedad bastante fértil con un porte semi-erguido u horizontal. El Amandin se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalizado.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado del Amandin lleva el número 5002.

### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

### Potencial tecnológico

Los racimos del Amandin son medianos a grandes, poco compactos y las bayas son medianas, jugosas, con una piel gruesa.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Amandin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse.

A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.

### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



