


Amandin B

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

Esta variedad se obtuvo en 1979 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Amandin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Amandin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas cuneiformes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, dientes medianos a largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula o muy reducida de los nervios, un limbo liso, brillante, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica u ovoide, con un ligero sabor a moscatel.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	229	247	176	186	256	240	235	255
Allele 2	143	236	249	186	192	262	254	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Amandin presenta un vigor medio a elevado. Es una variedad bastante fértil con un porte semi-erguido u horizontal. El Amandin se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalzado.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado del Amandin lleva el número 5002.

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Potencial tecnológico

Los racimos del Amandin son medianos a grandes, poco compactos y las bayas son medianas, jugosas, con una piel gruesa.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Amandin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse.

A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



