Gringet B

Variedad de uva de vino.

Origen

Es una variedad especifica y autóctona de la Alta Saboya (Valle del Arve).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Gringet

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Gringet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes cortos a medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	9	11	25	30	26	22

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 131	225	247	176	194	252	240	233	251
Allele 2 149	234	257	186	196	260	248	263	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad moderadamente productiva presenta un porte rastrero. Por tanto, debe ser empalizada y manejarse en poda corta o en 'Guyot simple'. El Gringet produce buenos resultados en cantizales inclinados.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Gringet lleva el número 947. En 1999, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una quincena de clones en los viñedos de Saboya.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas pequeñas. Esta variedad de uva se destina con frecuencia a la elaboración de vinos efervescentes (de aguja o espumosos). Los vinos de la Gringet son ligeros, vivos, con notas florales.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Gringet es sensible a la erinosis, al oídio y muy sensible al mildiu.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados