

Knipperlé B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad originaria de Alsacia sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Pinot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Knipperlé

Sinonimia

En Croacia, el Knipperlé es oficialmente denominado "Klessec". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Knipperlé está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Croacia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto con base en V, dientes cortos en relación a su anchura en la base,una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 152 | 104 | 13 | 7 | 0.2 |

Perfil genético

| Microsatell | iteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|-------------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 141 | 225 | 239 | 176 | 194 | 238 | 248 | 227 | 239 |
| Allele 2 | 149 | 232 | 239 | 186 | 196 | 246 | 254 | 235 | 249 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Knipperlé es una variedad de porte erguido, bien adaptada a los fríos invernales. Por el contrario, es sensible a la clorosis.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. En 2003, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de unos sesenta clones en Alsacia.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Knipperlé permite elaborar vinos de consumo rápido, agradables, suaves (poco ácidos) y cálidos (bastante ricos en alcohol).


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Knipperlé se muestra, sobre todo, sensible a las polillas del racimo y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier