Lauzet B

Variedad de uva de vino.

Origen

Se trata de una variedad autóctona de los viñedos pirenaicos.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Lauzet

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Lauzet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, de cinco o siete lóbulos con senos laterales muy profundos, abiertos, con fondo en U, un seno peciolar poco abierto o cerrado, con fondo en ocasiones limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes cortos en relación a su anchura en la base, una pigmentación antociánica media a elevada de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	19	1	2	1	1	5.4

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 131	227	239	186	188	252	248	233	255
Allele 2 153	236	257	188	204	252	266	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Lauzet es una variedad bastante vigorosa que suele manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Lauzet llevan los números 732, 862 y 896. Se llevó a cabo una plantación de una decena de clones en un conservatorio en los viñedos de Jurançon (Pirineos Atlánticos).

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas muy pequeñas. El Lauzet posee un potencial cualitativo interesante. Esta variedad permite obtener vinos secos bastante ricos en alcohol, al tiempo que conservan una acidez óptima, con aromas afrutados y especiados.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es un poco sensible a la podredumbre gris.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados