

Listan B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es de origen español (Andalucía).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Listan

Sinonimia

En la Unión Europea, el Listan es oficialmente denominado con otros nombres: Listan blanc (Chipre), Listan blanco (España), Malvasia Rei (Portugal), Palomino y Palomino fino (España). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Listan está inscrito oficialmente en el «[Catalogue des variétés de vigne](#)» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre, España y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de tamaño grande, de cinco lóbulos con senos laterales profundos, un seno peciolar abierto, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada con ombligo oscuro.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	1252	1269	899	770	530	228	31
----	------	------	-----	-----	-----	-----	----

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	182	188	252	240	235	255
Allele 2	143	238	249	191	194	258	240	247	257

Cultivo y habilidades agronómicas

El Listan es una variedad vigorosa, muy productiva y sensible al perdeoado. Debe manejarse en poda corta.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Listan lleva el número 367.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Listan son muy grandes y las bayas de medianas a grandes. El Listan posee un potencial bajo en azúcares y la acidez desciende con rapidez e intensidad al madurar. Los vinos son neutros y sensibles a la oxidación.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es un poco sensible al oídio y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*