

Lledoner pelut N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es una mutación del Grenache relativa, en particular, a la vellosoidad.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Lledoner pelut

Sinonimia

En España, el Lledoner pelut es oficialmente denominado "Garnacha Peluda". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Lledoner pelut está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de España.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas con un seno peciolar poco abierto o cerrado y, ocasionalmente presencia de un diente en el borde, un lóbulo intermedio alargado, un limbo con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1979	1988	1998	2008	2018
ha	212	625	584	534	286

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	135	223	239	191	188	258	240	243	239
Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad posee características y cualidades similares a las de la variedad Grenache. En ocasiones, se considera más vigorosa y presenta una sensibilidad menor a la corredura.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Lledoner pelut presenta un potencial similar al de la variedad Grenache, aunque con un grado alcohólico natural ligeramente inferior.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Lledoner pelut llevan los números 1055 y 1056.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Lledoner pelut reacciona frente a las principales enfermedades, como el Grenache, excepto los ácaros respecto a los cuales presenta una sensibilidad mayor.

Fenología


Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*