

Aramon N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad del Languedoc es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc y del Ouliven.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Aramon

Sinonimia

En Portugal, el Aramon es oficialmente denominado "Amor não me deixes". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Aramon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad de pelos tumbados elevada o muy elevada con una distribución de la pigmentación antocianica en ribete,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con un seno peciolar en V abierto, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y uno convexo, un limbo con bordes hacia el haz,
- a las bayas que tienen forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	150230	124052	63487	34666	11943	4429	1141

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	178	188	240	240	227	249
Allele 2	141	232	243	191	196	260	254	259	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Aramon es una variedad muy fértil, de vigor reducido y porte rastrero. Debe manejarse en poda corta. En climas cálidos y terrenos excesivamente fértiles, tiene incluso la tendencia a secarse. Es sensible al escaldado.


Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Aramon llevan los números 204, 323, 324, 325 y 401. Un conservatorio con casi 80 clones se plantó en 1997 en el departamento de Aude.


Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*