

Marsanne B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de la parte septentrional de las Côtes du Rhône.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Marsanne

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Marsanne está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre y Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- al pámpano con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas grandes, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos muy superpuestos, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo mate, abultado, con hinchazón marcada, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada y de color dorado o rojizo al madurar.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	277	268	235	406	1121	1266	1732

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	186	196	246	240	233	239
Allele 2	131	229	253	188	200	252	248	257	251

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad vigorosa, fértil y productiva debe manejarse en poda corta y reservarse, preferentemente, a terrenos poco fértiles y pedregosos. La Marsanne genera pámpanos largos que precisan un empalzamamiento suficiente y cuidadoso. Esta variedad bastante rústica, de ciclo corto y desborre tardío se adapta bien a zonas climáticas frescas.

Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Marsanne llevan los números 574, 1036, 1083, 1378 et 1395.


En 2001, se llevó a cabo una plantación de casi 250 clones en un conservatorio en Côtes du Rhône.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos de Marsanne son grandes, mientras que las bayas son pequeñas. La Marsanne permite elaborar vinos blancos secos o espumosos, bastante elegantes, moderadamente o poco ácidos, con aromas refinados y que a veces presentan una ligera dureza o un amargor en el final en boca.. Una producción gestionada de manera inadecuada puede perjudicar significativamente la calidad del vino.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Marsanne es sensible al oídio, a los ácaros y a la podredumbre gris.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*