

Monerac N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad, obtenida por el INRA en 1958, es el resultado de un cruce entre el Grenache y el Aramon.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Monerac

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Monerac está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- al pámpano con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	1998	2008	2018
ha	2	2	3	1.9

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	178	188	244	240	227	239
Allele 2	141	232	239	191	196	258	254	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad vigorosa, de porte semi-erguido, debe podarse en corto. Se puede manejar en gobelet o ser empalizada. Su producción es regular.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Monerac lleva el número 536.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 5 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son mediados a grandes. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es relativamente elevado. Los vinos son poco astringentes, pero carentes de color en ocasiones. El Monerac se adapta bien a la producción de vinos rosados.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Monerac es poco sensible a la podredumbre gris, pues sus racimos son bastante abiertos.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*