

Morrastel N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es de origen español, donde se conoce por el nombre de Graciano.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Morrastel

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Minustellu" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En la Unión Europea, el Morrastel puede denominarse oficialmente con otros nombres: Cagnulari (Italia), Graciano (España, Malta) y Tinta Miuda (Portugal).

Datos regulatorios

En Francia, el Morrastel está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: España, Malta, Portugal y Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo-anaranjado o amarillo con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, pentagonales u orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos superpuestos, dientes cortos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja o media de los nervios, un limbo con hinchazón y bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	1998	2008	2018
ha	7	6	6	57

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	176	186	252	262	243	239
Allele 2	149	236	239	180	188	260	270	257	255

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de porte semi-erguido a erguido se adapta bien a suelos calcáreos, a los terrenos de las laderas y a las condiciones de sequía. Se puede manejar en gobelet. Debido a su ciclo vegetativo largo, debe plantarse en zonas lo suficientemente cálidas.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son pequeñas. El Morrastel permite obtener vinos tánicos, un poco astringentes, robustos (sabor a pimienta) y con buen color. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es, sin embargo, bajo o medio.

Selección clonal en Francia

Los cinco clones Morrastel autorizados son los números 824, 949, 950, 1393 y 1394.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


Morrastel es susceptible a los cicadélidos y en ocasiones a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia, (por el nombre de "Graciano").
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*