Muscat à petits grains roses Rs

Variedad de uva de vino.

Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación rosada del Muscat à petits grains blancs.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muscat à petits grains roses

Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat à petits grains roses es oficialmente denominado con otros nombres: Moscatel de Grano Menudo Rojo (España) y Roter Muskateller (Alemania). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Muscat à petits grains roses está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania y España.

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Muscat à petits grains blancs, a excepción del color de la epidermis de las bayas maduras que, en este caso, es rosa. En ocasiones, las bayas también presentan una forma ligeramente achatada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2000	2008	2018
ha	114	117	98

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 131	225	233	176	186	252	240	245	263
Allele 2 131	234	249	191	196	256	248	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades son comparables a las de la variedad Muscat à petits grains blancs. El Muscat à petits grains roses parece ser, sin embargo, un poco más precoz.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat à petits grains roses lleva el número 1172.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas de medianas a grandes. El Muscat à petits grains roses permite obtener vinos de calidad comparable a los obtenidos con el Muscat à petits grains blancs.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento frente a las enfermedades también es similar al mostrado por el Muscat à petits grains blancs.

Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados