

Muscat à petits grains rouges Rg

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación roja del Muscat à petits grains blancs.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Muscat à petits grains rouges

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Muscat à petits grains blancs, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es rojo oscuro.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat à petits grains rouges es oficialmente denominado con otros nombres: Busuioaca de Bohotin (Rumanía), Moscatel Galego Roxo (Portugal) y Muskateller Roter (Austria). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Muscat à petits grains rouges está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Portugal y Rumanía.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	1998	2008	2018
ha	43	436	368	341	218

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	233	176	186	252	240	245	263
Allele 2	131	234	249	191	196	256	248	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Las cualidades son comparables a las de la variedad Muscat à petits grains blancs. El Muscat à petits grains rouges parece ser, sin embargo, un poco más precoz.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Muscat à petits grains rouges llevan los números 1194, 1382 et 1383.

Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Muscat à petits grains rouges permite obtener vinos secos o dulces de calidad. Se trata de vinos de un color moderado, con buen potencial y un equilibrio adecuado entre riqueza en azúcares y acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento frente a las enfermedades es similar al mostrado por el Muscat à petits grains blancs, quizá con una sensibilidad menor al oídio y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*