

# Muscat de Hambourg N

Variedad de uva de vino y de mesa.



## Origen

Esta variedad sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Muscat d'Alexandrie y el Frankenthal.

## Usar

Variedad de uva de vino y de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Muscat de Hambourg

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Muscat de Hambourg es oficialmente denominado con otros nombres: Black Muscat (Chipre), Hamburgi muskotály (Hungría), Muscat of Hamburg (Chipre), Moschato Ambourgou (Chipre) y Muskat-Trollinger (Alemania). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Muscat de Hambourg está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Está clasificado como variedad de vino solo en algunos departamentos (véase normativa en vigor). Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Hungría, Malta, Portugal y Rumanía.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, dientes medianos a grandes, de largo medio a largo en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, alabeado, ligeramente abultado, rizado en los bordes, y en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica y con sabor a moscatel.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ha  | 6321 | 7332 | 5962 | 5195 | 4253 | 4320 | 2968 |

## Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1       | 133  | 229   | 247   | 176    | 186     | 240     | 248    | 235    | 271    |
| Allele 2       | 147  | 236   | 249   | 182    | 192     | 256     | 254    | 243    | 271    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad de vigor medio a elevado posee un porte horizontal o semi-rastrero. Debe ser empalizada cuidadosamente y plantarse cuando sea posible en suelos de fertilidad media. El Muscat de Hambourg también es bastante sensible al desecado de los escobajos.

### Selección clonal en Francia


Los diez clones autorizados de Muscat de Hambourg llevan los números 193, 195, 200, 202, 203, 309, 932, 933, 934 y 967. Han sido seleccionados para la producción de uvas de mesa. Un conservatorio con más de una centena de clones fue instalado en Vaucluse en 2003.

### Fenología


Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*