

Oberlin noir N

Variedad de uva de vino.







Origen

El Oberlin noir (híbrido interespecífico) procede de un cruce entre el Gamay y *Vitis riparia*.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Oberlin noir

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "595 Orbelin" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Oberlin noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven semiabierto que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto a poco abierto, en ocasiones limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, un limbo con hinchazón fina, abultado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2000	2008	2018
ha	4500	2903	68	64	62

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	186	187	246	238	216	239
Allele 2	157	263	253	214	194	258	266	235	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Oberlin noir es una variedad vigorosa y fértil, con un porte semi-erguido que debe manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 5 días antes de la variedad Chasselas. Época de maduración: precoz, media semana antes de la variedad Siempre que sea posible, debe injertarse. Chasselas.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos, poco compactos y las bayas son pequeñas. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es muy bueno. El Oberlin noir permite elaborar unos vinos de calidad mediocre, de gran coloración, con presencia de antocianinas diglucósidas.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Oberlin noir es resistente al mildiu y al oídio.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

