

Abondant B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad cultivada en el este de Francia ha sido obtenida por A. Wanner. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre la Madeleine royale y el Kövidinka.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Abondant

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Abondant está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a los pámpanos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de gran tamaño, enteras con un seno peciolar poco abierto de bordes paralelos o lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos respecto a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo ligeramente abultado, plisado cerca del peciolo, con hinchazón y, en el envés del limbo, una baja densidad de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies de cepa-madre

| Año | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 21 | 14 | 3 | 2 | 0.8 |

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 141 | 225 | 247 | 178 | 194 | 246 | 248 | 216 | 251 |
| Allele 2 | 149 | 238 | 249 | 184 | 194 | 252 | 254 | 247 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Abondant es una variedad vigorosa, fértil en poda corta. Su desborre precoz la expone a las heladas de primavera.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de medianas a grandes. El Abondant produce unos vinos blancos bastante neutros y ordinarios.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Abondant es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*