


Perdea B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1954 a partir de un cruce entre el Raffiat de Moncade y el Chardonnay.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Perdea

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Perdea está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos a medianos en relación a su anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano, liso y en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 3 | 3 | 9 | 3 | 1.9 |

Perfil genético

| | Microsatellite VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|---------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 232 | 243 | 186 | 188 | 246 | 240 | 227 | 239 |
| Allele 2 | 141 | 238 | 249 | 186 | 188 | 252 | 254 | 233 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad posee un vigor óptimo. Se puede manejar en poda larga moderada y es preferible colocarla en tutores, aunque su porte sea bastante erguido. En ocasiones, se muestra sensible al millerandaje, pero permite no obstante obtener unos buenos rendimientos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Perdea lleva el número 742.

Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3^a época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son pequeñas a medianas. El Perdea permite elaborar vinos blancos secos agradables y de calidad. Generalmente, suelen ser vinos aromáticos y de acidez correcta.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Perdea es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
 - Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
-



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*