

# Arrufiac B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Arrufiac es una variedad autóctona del sudoeste (valle del Adour).

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Arrufiac

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Arrufiat" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Arrufiac está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes verdes con zonas ligeramente bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas con senos laterales profundos con la base en U con un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar con la base frecuentemente limitada por el nervio cerca del peciolo, una pigmentación antociánica elevada de los nervios y de los peciolos, un limbo con hinchazón y ondulado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a los racimos de forma cónica, un poco compactos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente ovoides.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	271	178	99	119	93	31

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	200	256	240	233	239
Allele 2	141	229	262	178	204	260	254	233	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad posee un vigor óptimo. Su fertilidad suele ser buena en general, pero también puede ser irregular. En ocasiones, presenta sensibilidad al millerandaje.


### Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Arrufiac llevan los números 405, 652, 653, 921 y 922. En 1996 y 1997, se plantaron dos conservatorios en Gers y Altos Pirineos; garantizan la conservación de 150 clones aproximadamente.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas pequeñas con piel gruesa. Esta variedad posee un potencial cualitativo interesante, en especial, a nivel de los aromas y su tipicidad.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Arrufiac es bastante sensible al mildiu y al black rot.

## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*