

# Pineau d'Aunis N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se encuentra en el Valle del Loira.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Pineau d'Aunis

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Pineau d'Aunis está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica intensa de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	1741	1432	1288	645	541	456	448
----	------	------	------	-----	-----	-----	-----

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	229	239	172	188	244	238	235	239
Allele 2	149	236	249	178	204	248	266	243	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Pineau d'Aunis es una variedad de vigor moderado, muy sensible al perdeoado y fértil en poda corta. En ocasiones, su producción tiende a ser irregular (alternancia). Por otro lado, se muestra sensible a la clorosis.

### Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Pineau d'Aunis llevan los números 235 y 289. Un conservatorio de esta variedad fue instalado en Vendomois (Loir y Cher) en 1997. Cuenta con 150 clones.

### Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas son de pequeño tamaño. El Pineau d'Aunis permite obtener unos vinos ligeros y de color deficiente, destinados a la elaboración de vinos rosados o vinos de base para espumosos. La calidad desciende rápidamente, a medida que aumenta el rendimiento de esta variedad.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Debido a la gran compacidad de sus racimos, esta variedad es sensible a la podredumbre gris. Por el contrario, es poco sensible a la excoresis

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*