

# Pinot blanc B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación blanca del Pinot noir.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Pinot blanc

## Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Pinot noir, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es verde-amarillo. Además, las hojas adultas del Pinot blanc suelen ser menos recortadas que las de las variedades Pinot gris y Pinot noir.

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Pinot blanc es oficialmente denominado con otros nombres: Beli pinot (Eslovenia), Pinot Bianco (Italia, Malta), Rulandské biele (Eslovaquia) y Weisser Burgunder (Alemania, Austria). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Pinot blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	610	812	1491	1565	1503	1262	1280

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	239	182	188	240	238	216	239
Allele 2	149	236	243	186	194	246	248	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Pinot blanc es una variedad bastante vigorosa y con una producción regular (más productiva que el Pinot gris o el Pinot noir). Un poco sensible a la clorosis, se adapta bien a suelos profundos, bastante cálidos, pedregosos o no. El Pinot blanc también presenta buena resistencia al frío.

### Selección clonal en Francia

Los cinco clones autorizados de Pinot blanc llevan los números 54, 55, 1294, 1295 y 1296. En 1984, se llevó a cabo en Alsacia la instalación de una colección-conservatorio con unos 200 clones. Otros dos conservatorios se han establecido: uno en Champaña, que comprende 24 clones, y otro en Cote d'Or en 1993, que comprende 14 clones.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son de pequeño tamaño. El Pinot blanc permite elaborar vinos agradables, ligeramente robustos y con una acidez media. También se puede utilizar para la elaboración de vinos de base para espumosos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es bastante delicada pues es relativamente sensible a las principales enfermedades.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*