

Piquepoul blanc B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación blanca del Piquepoul noir.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Piquepoul blanc

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Piquepoul blanc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- al pámpano con entrenudos de color verde o con estrías ligeramente rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en U abierto a poco abierto, dientes medianos a largos (en particular los que se corresponden a los nervios principales) de lados convexos, una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo con hinchazón, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas que son de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	903	856	592	594	650	1235	1748

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239
Allele 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad fértil y productiva se puede manejar en poda corta. Se adapta bien a los terrenos arcilloso-calcareos y arenosos (en otro tiempo, se cultivaba en pie franco en las arenas del litoral mediterráneo). De maduración bastante tardía, debe reservarse a zonas meridionales cálidas. Hay que evitar injertarlo sobre el 110 R.

Selección clonal en Francia


Los cuatro clones autorizados de Piquepoul blanc llevan los números 176, 237, 238 y 463. En 1994, se instaló un conservatorio de casi 400 clones en Hérault.

Fenología


Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*