

Portugais bleu N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad parece ser de origen austriaco.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Portugais bleu

Sinonimia

En la Unión Europea, el Portugais bleu es oficialmente denominado con otros nombres: Blauer Portugieser (Alemania, Austria), Kékoportó (Hungría), Modry Portugal (Rep. Checa, Eslovaquia), Oporto (Rumanía), Portoghese (Italia), Portugalka (Eslovenia), Portugizac (Croacia) y Português Azul (Portugal). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo fino, frágil, con bordes hacia el haz, alabeado, ocasionalmente abultado, brillante, uniforme y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Datos regulatorios

En Francia, el Portugais bleu está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa y Rumanía.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	1998	2008	2018
ha	1042	1040	945	270	87	14

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	243	178	188	250	248	227	251
Allele 2	149	229	255	191	204	260	248	259	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Portugais bleu es una variedad muy precoz, vigorosa, particularmente sensible al viento. Está adaptada a zonas climáticas frescas. No obstante, el Portugais bleu es bastante sensible a los fríos invernales y, por su desborre precoz, no tolera bien las heladas de primavera. Es ideal para terrenos arenosos y suelos bastante secos y pobres.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Portugais bleu lleva el número 939. En 2000, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de unos cuarenta clones en los viñedos de Auvernia (Macizo central).

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, media semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas son grandes. Los vinos de Portugais bleu, muy poco tánicos, de baja acidez y color bastante intenso, deben consumirse rápidamente o como vino joven.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Portugais bleu es sensible al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*