

Poulsard N

Variedad de uva de vino.



Origen

Es una variedad autóctona de los viñedos del Jura. Según los análisis genéticos publicados, el Poulsard sería directamente emparentado con la Rèze.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Poulsard

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Ploussard" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Poulsard está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- al pámpano con zarcillos largos a muy largo,
- a las hojas adultas, de cinco o siete lóbulos con senos laterales profundos con fondo en U, un seno peciolar en U abierto, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	314	279	292	297	308	311	257

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	233	176	194	248	238	216	239
Allele 2	135	236	247	186	196	256	240	243	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Poulsard es una variedad bastante delicada, sensible a las heladas de primavera, a la corredura y a los golpes de sol. Debe manejarse en poda larga y ser empalizada. El Poulsard se adapta bien a los suelos con predominio de marga o arcilla.

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños, mientras que las bayas son medianas a grandes. El Poulsard produce vinos de gran finura, aromáticos pero poco vigorosos, de color variable que, en ocasiones, adopta un tono «piel de cebolla».

Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Poulsard llevan los números 464, 584, 1047 y 1231. En 2005 se implantó en el Jura un conservatorio de 14 clones.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es especialmente sensible al oídio.

Fenología


Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*