

Roussanne B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del norte del Valle del Ródano.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Roussanne

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Roussanne está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, España y Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales muy profundos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes muy cortos en relación a su anchura en la base, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	71	54	51	120	676	1074	2179

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	196	240	240	257	251
Allele 2	131	229	253	186	200	252	248	257	255

Cultivo y habilidades agronómicas

La Roussanne produce unos pámpanos muy largos y, por este motivo, se precisa una colocación cuidada en tutores. Debe manejarse en poda larga moderada o en poda corta. Esta variedad se adapta bien a los suelos pobres arcilloso-calcareos bastante pedregosos y bien expuestos.

Selección clonal en Francia

Los seis clones autorizados de Roussanne llevan los números 467, 468, 469, 522, 1040 y 1384.


Un conservatorio de más de 50 clones fue instalado en el Valle del Ródano en 2001.

Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos. Las bayas son pequeñas y enrojecen cuando están completamente maduras. La Roussanne produce unos vinos de gran finura y complejidad (aromas florales y afrutados de miel, espino, albaricoque), potentes, con un buen equilibrio ácido y aptos para el envejecimiento. Esta variedad permite poner en valor y expresar los terruños de más calidad.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Roussanne es muy sensible al oídio, a la podredumbre gris, a los ácaros y trips.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*