

Roussette d'Ayze B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de la Alta Saboya.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Roussette d'Ayze

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Roussette d'Ayze está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas tamaño pequeño a mediano, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes cortos a medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|-----|
| ha | 6 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1.2 |
|----|---|---|----|---|---|-----|

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 182 | 188 | 252 | 248 | 235 | 239 |
| Allele 2 | 149 | 223 | 243 | 186 | 188 | 260 | 254 | 257 | 239 |

Cultivo y habilidades agronómicas

La Roussette d'Ayze es bastante fértil en poda corta. Esta variedad se adapta bien a los suelos de las morrenas glaciares.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Roussette d'Ayze lleva el número 940.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son pequeños a medianos. La Roussette d'Ayze produce unos vinos de calidad media, poco aromáticos. Se utiliza para la elaboración de vinos de base para espumosos.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Roussette d'Ayze es sensible a la podredumbre gris y al mildiu.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*