


Saint-Côme B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad autóctona de Aveyron, según los análisis genéticos publicados, es probablemente una descendiente del Gouais blanc y del Moural.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Saint-Côme

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Saint-Côme está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con una pigmentación antociánica elevada,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales con fondo redondeado, un seno peciolar poco abierto en V o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con hinchazón gruesa, con bordes ligeramente hacia el envés y abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados y una densidad elevada de pelos erguidos en los nervios,
- a las bayas de forma redondeada con pruina importante.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

3.3

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	247	172	204	238	238	227	239
Allele 2	137	238	249	176	204	248	238	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Saint-Côme es una variedad poco fértil que parece más adaptada a una poda larga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Saint-Côme lleva el número 1298. Un conservatorio de 3 clones fue plantado en Aveyron en 2005.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son medianas. El potencial de azúcares del Saint-Côme es bueno; esta variedad permite elaborar unos vinos blancos de acidez elevada.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Debido a la gran compacidad de sus racimos, el Saint-Côme es un poco sensible a la podredumbre gris. No parece presentar sensibilidad particular a las demás enfermedades criptogámicas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*