

# Saint-Pierre doré B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad autóctona de Allier es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc y de la Sauvignonasse.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Saint-Pierre doré

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Saint-Pierre doré está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes muy largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, abultado y con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	123	81	6	2	0.3

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	176	188	238	240	233	255
Allele 2	141	232	239	182	196	252	254	245	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Saint-Pierre doré es una variedad de vigor medio, bastante productiva, que se ha de manejar en poda larga moderada.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Saint-Pierre doré produce unos vinos comunes, de bajo grado alcohólico y relativamente ácidos, que pueden utilizarse como vinos de base para espumosos.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Saint-Pierre doré es extremadamente sensible a la podredumbre gris pero, por el contrario, es bastante resistente al oídio y al mildiu.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*