

# Sauvignon B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El centro de Francia o el sudoeste son las dos zonas originarias posibles de esta variedad. Según los análisis genéticos publicados, el Sauvignon sería directamente emparentado con el Savagnin.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Sauvignon

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo o amarillo con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas pequeñas o medianas, orbiculares de cinco lóbulos con un seno peciolar poco abierto a abierto, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón, alabeado, rizado en los bordes y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Sauvignon es oficialmente denominado con otros nombres: Sauvignon blanc (Alemania, Austria, España, Hungría, Malta, Países Bajos) y Zeleni sauvignon (Eslovenia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Sauvignon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión

Europea: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa y Rumanía.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	5508	8867	7028	12026	19974	24473	30955

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	172	188	246	240	233	239
Allele 2	149	229	257	186	194	248	248	235	255

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Sauvignon es muy vigorosa y con tendencia a acumular vegetación. Sobre todo, debemos intentar controlar este vigor plantándola en terrenos poco o moderadamente fértiles, utilizando portainjertos débiles y practicando una poda adaptada, que puede ser bastante generosa en los primeros años. Mediante una colocación cuidada en tutores y un sistema de manejo adecuado, también debemos intentar obtener un microclima favorable para los racimos.

### Selección clonal en Francia


Los dieciocho clones autorizados de Sauvignon llevan los números 107, 108, 159, 160, 161, 240, 241, 242, 297, 376, 377, 378, 379, 530, 531, 619, 905 y 906. En 1993, 1994 y 2001, se plantaron tres conservatorios con un total aproximado de 400 clones en el viñedo bordelés y en el Valle del Loira.

### Fenología


Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*