

Terret gris G

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad se corresponde con la mutación gris del Terret noir.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Terret gris

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Terret-Bourret" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Terret gris está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Croacia.

Elementos de descripción

La descripción se corresponde a la de la variedad Terret noir, a excepción del color de la epidermis de las bayas al madurar que, en este caso, es gris y su forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	15017	13384	8987	6191	214	131	40
----	-------	-------	------	------	-----	-----	----

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cultivo y habilidades agronómicas

El Terret gris presenta aptitudes comparables a las de la variedad Terret noir. Se muestra bastante sensible al pardeado.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Terret gris lleva el número 1219. Se están llevando a cabo trabajos de selección tras las prospecciones realizadas en los viñedos de Hérault. Un conservatorio de una decena clones fue implantado en el departamento de Hérault en 2003.

Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media a 5 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Terret gris produce unos vinos neutros y de bajo grado alcohólico.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El comportamiento del Terret gris frente a las enfermedades es comparable al de la variedad Terret noir.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*