

# Terret noir N

Variedad de uva de vino.



## Origen

La variedad Terret noir procede de Languedoc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Terret noir

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Terret noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con senos laterales superiores con base en U y lóbulos superpuestos, un seno peciolar poco abierto o cerrado de lóbulos superpuestos, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	131	151	1149	808	623	273	65

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Terret noir posee un porte erguido. Se adapta bien al manejo en gobelet o en cordón.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Terret noir lleva el número 1084.

### Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Terret noir produce vinos ligeros, de bajo grado alcohólico y carentes de color.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Terret noir es bastante sensible al mildiu y al oídio. Es también susceptible a las enfermedades de madera.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
  - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

---



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*