

# Tourbat B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad parece ser originaria de Cataluña, pero también la encontramos en Cerdeña.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Tourbat

## Sinonimia

En Italia, el Tourbat es oficialmente denominado "Torbato". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Tourbat está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos superpuestos o muy superpuestos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	112	141	10	14	20	33	32
----	-----	-----	----	----	----	----	----

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	141	229	243	176	186	248	254	235	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	238	249	178	188	252	254	257	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Tourbat posee un porte rastrero y de arbusto. Debe manejarse en poda corta y debe plantarse en suelos cálidos y secos. Por otra parte, es un poco sensible a las carencias de magnesio.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, bastante abiertos y las bayas de medianas a grandes. En general, el Tourbat conserva una acidez óptima al madurar. Produce unos vinos ligeramente aromáticos y con cuerpo.

### Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Tourbat llevan los números 911 y 987.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Tourbat es bastante sensible al oídio, a los trips y a los cicadélidos.

### Fenología


Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*