

Trousseau N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad originaria de Jura es, según los análisis genéticos realizados en Montpellier, probablemente una descendiente del Savagnin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Trousseau

Sinonimia

En la Unión Europea, el Trousseau es oficialmente denominado con otros nombres: Bastardo (Chipre, Portugal) y Merenzao (España). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Trousseau está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre, España y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados con una distribución de la pigmentación antociánica en ribete,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos y con bordes que se oponen hacia el envés del limbo, dientes cortos, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo alabeado, ligeramente abultado, plisado en el peciolo, con hinchazón intensa y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	166	143	76	85	139	165	177

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	236	239	172	188	246	248	233	239
Allele 2	149	236	257	186	188	248	254	247	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Trousseau es una variedad vigorosa que debe plantarse en terrenos bien expuestos para alcanzar una maduración óptima. Puede manejarse en poda corta o larga, en función de las condiciones climáticas.


Selección clonal en Francia

Los siete clones autorizados de Trousseau llevan los números 1004, 1017, 1021, 1026, 1114, 1277 y 1278. En 2005 se plantó un conservatorio de unos 50 clones en el Jura. En 2013 se instaló en Charente otro conservatorio de 10 clones.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son de tamaño mediano. El Trousseau permite elaborar vinos con carácter, cálidos, robustos y estructurados, pero de color poco sostenido si los rendimientos son elevados. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es elevado.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Trousseau es bastante sensible a las enfermedades y, en particular, a la podredumbre gris. Es también bastante sensible a los cicadélidos y es susceptible a las enfermedades de madera.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*