

Valensi noir N

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad de uva de mesa parece ser originaria de España o del sur de Francia.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Valensi noir

Sinonimia

En España, el Valensi noir es oficialmente denominado "Valenci Tinto". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Valensi noir está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de España.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, con fondo en U, dientes pequeños de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula, baja o media de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-----	------	------	------	------	------	------	------

ha	73	82	159	105	22	18	3.1
----	----	----	-----	-----	----	----	-----

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	135	225	239	178	188	244	254	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	141	234	243	186	196	248	254	259	255
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cultivo y habilidades agronómicas

El Valensi noir es una variedad de gran vigor, con un porte semi-erguido que debe manejarse en poda larga.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Valensi noir son grandes, con un pedúnculo largo y poco lignificado. Las bayas son medianas a grandes, con gran presencia de pruina. La pulpa es jugosa, de sabor simple.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Valensi noir es poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages. P. Galet, 2000, Ed. Hachette, Paris, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*