

Vermentino B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad, cultivada en Córcega y Provenza desde hace mucho tiempo, parece ser originaria de Italia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Vermentino

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Rolle", "Garbesso" o "Vermentinu" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Italia, el Vermentino puede denominarse oficialmente «Favorita» y «Pigato».

Datos regulatorios

En Francia, el Vermentino está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, España, Italia y Malta.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, de color verde oscuro, de cinco o siete lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo alabeado, ligeramente abultado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	1998	2008	2018
ha	2106	1057	833	2507	3089	6333

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	249	176	200	250	240	235	249
Allele 2	149	236	249	178	204	260	248	243	255

Cultivo y habilidades agronómicas

Es una variedad bastante productiva y vigorosa, que debe podarse en corto. Una cuidada colocación en tutores es preferible para mantener la vegetación. Esta variedad meridional se adapta bien a zonas cálidas y a los terrenos secos y poco fértiles.

Selección clonal en Francia


Los catorce clones autorizados de Vermentino llevan los números 639, 640, 766, 795, 856, 876, 912, 913, 914, 915, 963, 964, 1081 y 1082. En 2005, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de unos cincuenta de clones en los viñedos de Córcega.

Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Vermentino produce vinos de calidad, agradables y de un bonito color pálido. Estos vinos finos, equilibrados y grasos presentan una riqueza aromática interesante (aromas florales de espino, afrutados a pera, etc.), incluso aunque en ocasiones carecen de acidez.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Vermentino es un poco sensible a la podredumbre gris, moderadamente sensible a la podredumbre ácida y bastante sensible al oídio.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[página web](#), consultada en 2020].



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*