

Humagne rouge N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del Valle de Aosta. Según los análisis genéticos publicados, el Humagne rouge sería directamente emparentado con el Cornalin du Valais.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Humagne rouge

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Humagne rouge está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista B. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con superficie acanalada y entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales moderadamente profundos, un seno peciolar en U cerrado o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos a grandes, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo verde oscuro, con hinchazón moderada, ligeramente ondulado entre los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	194	240	238	247	249
Allele 2	137	225	257	186	194	246	238	267	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Humagne rouge es una variedad bastante vigorosa y de fertilidad regular. Se adapta a los suelos moderadamente o poco fértiles y bien expuestos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Humagne rouge lleva el número 6002.

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas del Humagne rouge son de tamaño medio. Esta variedad permite elaborar unos vinos poco ácidos y ligeros. El potencial en azúcares es moderado y se precisa una buena maduración para evitar un carácter herbáceo.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Humagne rouge es un poco sensible a la podredumbre gris.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier