

Admirable de Courtiller B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida por M. Courtiller en el siglo XIX en la región de Saumur. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre la Bicane y el Chasselas.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Admirable de Courtiller

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Admirable de Courtiller está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad de media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco o siete lóbulos con un seno peciolar con fondo en U, poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, de dientes medianos con lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo liso, brillante y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y una densidad nula o baja de pelos tumbados,
- a las bayas con forma elíptica u ovoide y con una epidermis que puede adoptar un tono ligeramente rosado al alcanzar un exceso de maduración.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2000	2008	2018
ha	909	898	369	35	22	6.9

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	188	252	240	233	239
Allele 2	135	234	243	191	194	258	254	267	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Admirable de Courtiller presenta un vigor bajo a medio y posee un porte semi-erguido. Su potencial de rendimiento es medio. Tiene tendencia a producir gran cantidad de rebuscos y, en ocasiones, es sensible a la corredura y al millerandaje. Es preferible plantar el Admirable de Courtiller en terreno secos y bien expuestos.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Admirable de Courtiller lleva el número 1308.

Fenología


época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*