

Genouillet N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad autóctona del centro de Francia sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Tressot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Genouillet

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Genouillet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2001, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes a cordiformes, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores profundos, un seno peciolar poco abierto en V, dientes pequeños a medianos, de lados rectilíneos o con un lado convexo y uno cóncavo, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y una densidad nula de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	2018
ha	2	4.3

Perfil genético

	Microsatellite VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	178	200	244	238	216	239
Allele 2	137	232	249	186	204	246	238	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Genouillet es una variedad de vigor moderado y debe manejarse preferentemente en poda corta. El porte de los pámpanos es semi-erguido.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Genouillet lleva el número 1291.

Potencial tecnológico

Los racimos de Genouillet son medianos y compactos y las bayas son también medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos frescos, ligeros, con color y agradables.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Genouillet es sensible a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2^a época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
 - Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
 - Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.
 - Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.
-



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*