# Sérénèze N

## Variedad de uva de vino.

### Origen

Esta variedad originaria de Isère sería, según los análisis genéticos realizados en Montpellier, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Chatus.

### Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Sérénèze

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos regulatorios

En Francia, la Sérénèze está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

---

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños a medianos, de lados rectilíneos o con un lado convexo y uno cóncavo, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y alabeado, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y una densidad nula o muy baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente achatada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| | |
|---|---|
| **Año** | 2018 |
| **ha** | 0.2 |

# Perfil genético

| MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allele 1 131 | 223 | 249 | 178 | 188 | 244 | 238 | 235 | 271 |
| Allele 2 131 | 232 | 249 | 191 | 204 | 252 | 240 | 245 | 271 |

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Sérénèze es una variedad de vigor moderado, generalmente manejada en poda larga. Es bastante resistente a las heladas invernales y el porte de los pámpanos es semi-erguido a erguido.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Sérénèze lleva el número 1300.

### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas de Sérénèze son de tamaño mediano. Esta variedad permite elaborar unos vinos ligeros y afrutados, pero de color deficiente y relativamente ácidos.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Sérénèze es muy sensible al mildiu y también es sensible a la podredumbre gris.

### Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Maturité




### Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

*Plantuva, todos los derechos reservados,*
*plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®*
*INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados