

Pinotage N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad obtenida por A.I. Perold, en Sudáfrica en 1925, es el resultado de un cruce entre el Pinot noir y el Cinsaut.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Pinotage

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Pinotage está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2012, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes, de cinco lóbulos, con senos laterales abiertos, con presencia bastante frecuente de un diente en el fondo, un seno peciolar en U abierto con presencia de un diente, dientes cortos, de lados rectilíneos, un limbo ondulado entre los nervios, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma netamente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

1.3

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	194	240	248	216	239
Allele 2	149	236	247	182	204	246	248	227	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Pinotage es una variedad de vigor medio. Bastante fértil y productivo, puede manejarse en poda corta. El porte de los pámpanos es erguido, pero son bastante sensibles al viento y es preferible su colocación en espalderas.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Pinotage lleva el número 1186.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Pinotage son pequeños a medianos, cilíndricos, anchos y compactos, con un pedúnculo corto. Las bayas son también pequeñas a medianas. Esta variedad permite elaborar unos vinos bastante robustos y de gran tipicidad, con un carácter aromático particular. También se puede utilizar para elaborar unos vinos rosados o incluso vinos dulces naturales.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Pinotage no presenta sensibilidad particular a las enfermedades criptogámicas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- Guide des cépages: 300 cépages et leurs vins. H. Ambrosi et al., 1997, Ed. Ulmer, Francia.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa, PG. Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*