

# Fanny B

Variedad ornamental para aficionados.



## Origen

La variedad Fanny (híbrido interespecífico) fue obtenida en Hungría. Este híbrido interespecífico procedería de un cruce complejo que incluye el Villard blanc (12375 Seyve-Villard).

## Usar

Variedad ornamental para aficionados.

## Nombre de la variedad en Francia

Fanny

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Fanny está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2013 en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria y Hungría.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, orbiculares, de cinco lóbulos con senos laterales superiores marcados con fondo en V, un seno peciolar poco abierto, dientes medianos, largos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula o muy baja de los nervios, un limbo alabeado, con bordes muy orientados hacia el haz, liso y brillante y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	237	178	178	256	240	233	255
Allele 2	147	234	249	182	186	258	248	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

La variedad Fanny posee un porte semi-erguido, un vigor moderado y es bastante productiva.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de Fanny son grandes y bastante abiertos. Las bayas son medianas a grandes, de sabor simple y una pulpa muy firme.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La variedad Fanny es un poco sensible al mildiu, al oídio y a la excoriosis.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Beschreibende Sortenliste Reben. Bundessortenamt, 2015, Hannover, Alemania.

- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Alemania.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Pologne.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*