

Sugraeighteen B

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad fue obtenida en 1990 por D. W. Cain (EE. UU.) y procedería del cruce entre el Red Globe y un descendiente de Muscat d'Alexandrie por Sugraone.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Sugraeighteen

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Sugraeighteen está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2014 en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula a muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas o cobrizas, con una densidad nula a muy baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas grandes, pentagonales u orbiculares, de tres a cinco lóbulos, con un seno peciolar en V cerrado, dientes de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, plisado en el peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 0

Perfil genético

| MicrosatelliteVVS2 | | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 133 | 223 | 249 | 176 | 186 | 256 | 248 | 247 | 249 |
| Allele 2 | 149 | 236 | 251 | 178 | 204 | 260 | 254 | 257 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Sugraeighteen es fértil, productiva y con un porte semi-erguido. Esta variedad posee un crecimiento vegetativo vigoroso que es preciso controlar.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Sugraeighteen son grandes y moderadamente compactos. Las bayas son grandes, de sabor amoscatelado, con un pellejo de grosor fino a mediano y una pulpa firme y crujiente. Las pepitas son blandas y poco perceptibles. Las bayas son sensibles a los roces y a la ruptura y no presentan grandes aptitudes de conservación.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Sugraeighteen no parece presentar sensibilidad particular a las enfermedades ni a las plagas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier