

Roditis Rs

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Grecia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Roditis

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Roditis está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: Chipre y Grecia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos que pueden presentar estrías rojas,
- a las hojas adultas medianas a grandes, de tres o cinco lóbulos, un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes medianos a largos en relación a su ancho en la base, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antociánica parcial de los nervios, un limbo muy brillante, con bordes hacia el haz, liso o con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	194	240	238	235	251	
Allele 2	143	225	249	191	202	252	240	247	271	

Cultivo y habilidades agronómicas

El Roditis es una variedad vigorosa, productiva y de porte erguido. Tolera bien la sequía y es preferible cultivarlo en suelos ligeros y calcáreos. Si se cultiva en suelos fértiles y profundos, el Roditis podría presentar unos rendimientos importantes. En ocasiones, presenta corredura o millerandaje.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Roditis lleva el número 1254.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3^a época, 5 semanas a 5 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos del Roditis son medianos a grandes y moderadamente compactos. Las bayas son medianas a grandes, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa. El color de las bayas está asociado al rendimiento: cuanto más elevado, más verdes serán las uvas. Los vinos elaborados con el Roditis son equilibrados, pero poco aptos para el envejecimiento. Los aromas típicos de esta variedad son el melocotón, el albaricoque, las frutas tropicales, la manzana y el plátano.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Roditis es muy sensible al mildiu y no tanto al oídio y a la excoriosis.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Ampélographie hellénique. B. Krimbas, 1943, Grecia.
- Plaquettes Hellenifera. K. Bakasietas, S. Petropoulos y G. Tavaditis, 2019, Grecia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



Plantgrape, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier