

Lakemont B

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

El Lakemont fue obtenido por J. Einset en EE. UU. en 1972. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Ontario y la Sultanine.

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Lakemont

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Lakemont está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2017, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color verde que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde-amarillo, con una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas,
- a las hojas adultas pentagonales, enteras, de color verde oscuro con un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes mucronados, muy cortos en relación a su base, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano, abultado, ondulado entre los nervios, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	120	232	235	178	188	248	239	225	239
Allele 2	149	236	253	182	202	248	248	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Lakemont es una variedad productiva con un vigor moderado y un porte semi-erguido.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.

Debourrement


Potencial tecnológico

Los racimos del Lakemont son medianos a grandes y bastante compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino, con pruina y una pulpa poco jugosa. Las bayas del Lakemont suelen ser apirenas y, si tienen pepitas, son blandas y poco perceptibles.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Lakemont es un poco sensible al mildiu y al oídio y es sensible a la excoriosis.

A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Alemania.
- Table grapes for cool climates, B. Reisch et al., 1993, EE. UU.
- New York's food and life sciences bulletin, J. Einset, 1972, EE. UU.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*