

# Artaban N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad Artaban fue obtenida por el INRA y el Julius Kühn Institut. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre un descendiente de *Muscadinia rotundifolia* y el Regent.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Artaban

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Artaban está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco lóbulos con senos laterales superiores con fondo en V y de lóbulos ligeramente superpuestos, un seno peciolar en V, cerrado o con bordes paralelos en prolongación del nervio central, dientes medianos en relación a su base, de lados rectilíneos, una ligera pigmentación antocianica de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, poco abultado, con hinchazón moderada y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada, con pruina moteada y ausente en el ombligo.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

4.9

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	200	260	240	243	239
Allele 2	149	223	253	186	204	260	248	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Artaban posee un vigor medio y tiene un porte semi-erguido. Es muy sensible a la carencia de magnesio y puede presentar un enrojecimiento intenso del follaje en otoño, así como algunas dificultades de agostamiento por su interrupción del crecimiento vegetativo tardío.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Artaban lleva el número 1267.

### Fenología

época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Artaban son grandes, de forma cónica y compactos. Las bayas son pequeñas, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa blanda y jugosa. Los vinos obtenidos del Artaban son ligeros, con buen color, destinados a un consumo rápido y dominados por aromas afrutados.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Artaban es resistente al mildiu y al oídio. Por el contrario, es sensible al black rot y un poco sensible a la podredumbre gris. En situaciones de riesgo, la protección con fungicidas sigue siendo indispensable.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Ficha varietal Artaban, C. Schneider, 2018.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*