

Gibert N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Gibert parece ser originario de Lot. Los estudios genéticos recientes realizados en Montpellier han demostrado que sería el resultado de un cruce entre el Cot y el Colombeau.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Gibert

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Gibert está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color blanco y, a continuación, amarillo, con una densidad elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas medianas a grandes, con cinco a siete lóbulos, con un seno peciolar cerrado o de lóbulos superpuestos, dientes de largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica muy baja a nula de los nervios, un limbo plano, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0.1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	182	186	240	238	233	239
Allele 2	131	225	262	188	202	260	266	257	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Gibert es una variedad vigorosa, muy productiva y de porte semi-erguido. Debido a su desborre más bien tardío, es poco sensible a las heladas de primavera.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Gibert lleva el número 1372.


En 2012, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 5 clones de Gibert en la Ferme Départementale d'Anglars-Juillac en el departamento de Lot.

Fenología


época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 3ª época, 4 semanas a 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- Synonymie ampélographique de l'Ouest viticole français. Artozoul et al., 1960, Ed. INRA, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*