

# Bourboulenc B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad parece ser de origen provenzal.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Bourboulenc

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Doucillon blanc" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Portugal, el Bourboulenc puede denominarse oficialmente "Pé comprido".

## Datos regulatorios

En Francia, el Bourboulenc está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de España.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de tres lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos muy superpuestos y un diente bastante frecuente en el borde, un lóbulo central alargado, dientes cortos respecto a su ancho en la base, un limbo con hinchazón, mate, ondulado entre los nervios cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas que son de forma elíptica y presentan una piel gruesa.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1279	703	373	723	771	661	509

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	186	246	240	233	255
Allele 2	131	223	239	186	196	252	248	257	255

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad posee una fertilidad media. Debe manejarse en poda corta y ser empalizada suficiente debido a su porte semi-rastrero. El Bourboulenc está bien adaptado a la sequía. La maduración de esta cepa es lenta y es necesario cultivarla en terrenos cálidos y bien expuestos para que alcancen la maduración completa.

### Selección clonal en Francia


Los dos clones autorizados de Bourboulenc llevan los números 541 y 1002.

### Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Bourboulenc permite elaborar unos vinos finos, con un grado alcohólico poco elevado y medianamente intensos desde el punto de vista aromático.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Bourboulenc es sensible al oídio, pero tolera bien la podredumbre gris.

## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*